




BECLJET[®]

dipropionate de béclométasone
250 microgrammes/dose

Solution pour inhalation
en flacon pressurisé

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?
3. Comment utiliser BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?
6. Informations supplémentaires



1 QU'EST-CE QUE BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un corticoïde anti-inflammatoire qui s'administre par voie inhalée. Il est préconisé en traitement de fond continu et régulier de l'asthme. Il ne doit pas être interrompu sans avis médical, même en cas d'amélioration très nette des symptômes.

Attention : ce médicament n'est pas un bronchodilatateur. Il ne permet pas le traitement de la crise d'asthme.

Il n'apporte pas de soulagement immédiat. Il est en particulier sans action sur la crise d'asthme déclarée.

Son efficacité ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours et dépend du respect rigoureux de la posologie (dose et nombre de prises) prescrite par votre médecin et adaptée à votre cas.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?

N'utilisez jamais BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé :

- En cas d'allergie (hypersensibilité) à ce médicament.
- En cas d'apparition d'une toux, d'une gêne respiratoire ou d'augmentation de sifflements (bronchospasmes) juste après l'inhalation de ce médicament, ne pas renouveler la prise mais demander conseil à votre médecin.
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin.

Faites attention avec BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé :

En cas de survenue de crises d'asthme ou de gêne respiratoire, il faut utiliser un autre médicament bronchodilatateur bêta2 mimétique par voie inhalée à action rapide et de courte durée que votre médecin vous aura prescrit à cet effet.

Le soulagement habituellement obtenu avec le bronchodilatateur bêta2 mimétique par voie inhalée doit alors être observé rapidement. En cas d'échec, consulter immédiatement un médecin.

Si la dose habituellement efficace de ce médicament devient insuffisante, si les crises ou les épisodes de gêne respiratoire deviennent

plus fréquents, il faut craindre une aggravation de la maladie : consultez rapidement votre médecin qui réévaluera votre traitement.

Ce produit, actif en inhalation, doit atteindre l'extrémité des petites bronches. En cas d'encombrement des voies respiratoires (par des mucosités abondantes) ou d'infection, son efficacité peut être diminuée. Il convient de consulter rapidement votre médecin afin qu'il instaure un traitement adapté.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger du traitement le mieux adapté à votre cas.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout traitement.

Sportifs

Attention cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Informations importantes concernant certains composants de BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé

Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100mg par dose.

3 COMMENT UTILISER BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?

Posologie

La posologie est strictement individuelle et sera adaptée par votre médecin en fonction de la sévérité de votre asthme.

A titre indicatif, la dose quotidienne de ce médicament est :

- chez l'adulte : 2 à 8 inhalations par jour réparties en 2 prises par jour,
- chez l'enfant : 2 à 4 inhalations par jour réparties en 2 prises par jour.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si les troubles persistent, consultez rapidement votre médecin.



Mode et voie d'administration


Ce médicament s'inhale grâce au distributeur avec embout buccal (voie respiratoire exclusivement).

Lisez attentivement ce mode d'emploi : l'efficacité de ce médicament est en partie dépendante du bon usage du dispositif de distribution. Au besoin, n'hésitez pas à demander à votre médecin ou à votre pharmacien de vous fournir des explications détaillées.

Si vous utilisez le dispositif pour la première fois ou s'il n'a pas été utilisé depuis au moins trois jours, déclenchez une fois l'aérosol afin de vous assurer de son bon fonctionnement sans mettre le dispositif à la bouche et sans effectuer l'inhalation.



- Agitez l'appareil et enlevez le capuchon pour dégager l'embout buccal,
- Expirez profondément pour vider vos poumons (fig. A),
- Mettez l'embout buccal dans la bouche, le fond de la cartouche métallique dirigé vers le haut,
- Appuyez sur le fond de la cartouche (fig. B1),
- Inspirez lentement et profondément (fig. B2),
- Retirez l'embout buccal de la bouche et retenez votre respiration pendant au moins 10 secondes (fig. C),
- Refermez la chambre d'inhalation avec le capuchon de protection,
- Par mesure d'hygiène, l'embout buccal doit être nettoyé après utilisation,
- Se rincer la bouche après inhalation.



Chaque pression sur le fond de la cartouche délivre une dose précise. La durée de la pression n'a donc pas d'importance.



Nettoyage : s'il est nécessaire, retirer la cartouche, rincer la chambre d'inhalation à l'eau tiède, sécher et remettre la cartouche (fig. D).

Contrôlez votre technique d'inhalation devant une glace : si une quantité importante de produit s'échappe par le nez ou la bouche, les points suivants sont à surveiller : soit la pression sur la cartouche métallique a eu lieu trop tôt avant le début ou après la fin de l'inspiration, soit l'inspiration n'a pas été suffisamment profonde.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

Les prises doivent être réparties à intervalles réguliers.

Durée du traitement

Le traitement de la maladie asthmatique exige de votre part un effort quotidien. Ce médicament doit être utilisé très régulièrement et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

Si vous avez utilisé plus de BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin. Si vous ressentez le besoin de prendre plus de BECLOJET que votre médecin l'a prescrit, cela peut être le signe d'une aggravation de votre maladie.

Si vous oubliez d'utiliser BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4 QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BECLOJET peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas chez tout le monde. Ces effets peuvent être :

- réaction allergique (rarement, apparition d'une toux ou augmentation de sifflements) : arrêtez le traitement et consultez votre médecin.
- gêne persistante dans la bouche ou dans la gorge : continuez votre traitement et contactez votre médecin.
- candidose buccale (infection de la bouche due à des champignons) : continuez votre traitement et contactez votre médecin, il vous donnera un traitement spécifique.

Cela peut être prévenu en se rinçant la bouche à l'eau (puis recracher l'eau) après inhalation du produit.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, informez votre médecin ou votre pharmacien.

5 COMMENT CONSERVER BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Réceptif sous pression : à protéger des rayons du soleil et ne pas

exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?

La substance active est :

Dipropionate de béclométazone.....250 microgrammes
Pour une dose.

Les autres composants sont :

Ethanol, Glycérol.
Gaz propulseur : Norflurane (HFA 134A).

Qu'est-ce que BECLOJET 250 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'une solution pour inhalation en flacon pressurisé de 200 doses.

Titulaire/Exploitant

CHIESI S.A.

11, avenue Dubonnet
92400 Courbevoie - France

Fabricant

CHIESI S.A.

13, rue Faraday
41260 La Chaussée Saint Victor - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Décembre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps : www.afssaps.sante.fr

Cette notice est également disponible gratuitement en braille et en caractères agrandis, auprès de HandicapZéro sur simple demande au 0800.39.39.51 ou sur pharmabraille.fr



CHIESI S.A. cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine et participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. CHIESI S.A. vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

00024 V4

Chiesi

